

Gebruiksaanwijzing

Uitsluitend te gebruiken na het gebruik van Lianol basdiar



I - Welke biggen?

- Alle biggen en alle tomen

II - Wat te doen voor spenen

- Start met het toevoegen van Lianol 2wean concentraat vanaf dag 8 na geboorte tot spenen.
- Zorg voor een geleidelijke overgang van Lianol basdiar naar een Lianol 2wean voeder.
- Voorzie voor de beste resultaten een prestarter en een biggenvoer. Beide met 2wean concentraat.
- Schenk voldoende aandacht aan het drinknippeldebiet in de kraamstal.

III - Wat te doen na spenen

- Voeg Lianol 2wean toe aan een voer vanaf spenen tot 10 dagen na spenen.
- Schakel dan over naar het originele biggenvoer.
- Voorzie steeds voldoende water.

Lianol 2wean

Lianol 2wean is een concentraat dat aan een ratio van 2 á 3 % wordt toegevoegd aan het voer. Dit kan op aanvraag in de voederfabriek gebeuren of manueel door topdressing.

Voor de beste resultaten zorg je best voor geleidelijke voerovergangen tussen verschillende voeders en voor 2 type voeders (prestarter en biggenvoer). Schakelen gebeurt best 2 dagen voor of na spenen.

