

# Gebruiksaanwijzing



(Gebruik Lianol ferti minimaal 5 maanden voor een goede en onderbouwde evaluatie)

## I - Welke zeugen?

Maak een vruchtbaarheidsanalyse van het bedrijf per pariteit:

- A: Probleem bij 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> worps zeugen? Een vaak voorkomende oorzaak is een energieprobleem. Geef Lianol ferti aan vermagerde zeugen en 1<sup>e</sup>/2<sup>e</sup> worps zeugen.
- B: Probleem bij alle zeugen? Een vaak voorkomende oorzaak is management en/of dekmoment. Geef Lianol ferti aan alle zeugen en heb aandacht voor onderliggende factoren.

## II - Wat te doen voor spenen

- Merk 1 week voor spenen de te behandelen zeugen.
- Dit door middel van een kleurmarkering op de zeug en op de zeugenkaart.
- Start met de behandeling 2 á 3 dagen voor spenen.
- Geef de tablet voor het voeren in de trog voor een bevestigde opname.

## III - Wat te doen bij spenen

- Zet de behandelde zeugen bij elkaar.
- Niet enkel jonge zeugen langs elkaar plaatsen. Dit is negatief voor de berigheid.
- Geef deze zeugen een tablet op de speendag en tot 2 á 3 dagen nadien.

## IV - Samengevat

- 1 bolus per dag.
- 2 á 3 dagen voor het spenen, op de speendag en 2 á 3 dagen na het spenen.
- In totaal 5 bolussen per zeug en 7 bolussen voor de 1<sup>e</sup> worps zeug!
- Houd rekening met conditie van de zeug - dekmoment - licht - zoekbeer